

09 ФЕВ 2024

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Мелоксигард

(Организация-разработчик: АО «Научно-производственная фирма «Экопром»;
Московская обл., г. Люберцы, р. п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263)

Номер регистрационного удостоверения: 32-328.23-5704N/ПР-303.24/03011

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мелоксигард (Meloxyguard).

Международное непатентованное наименование действующего вещества: мелоксикам.

2. Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.

Выпускают препарат в двух дозировках: таблетки 0,5 мг и 2,0 мг, которые в качестве действующего вещества содержат (в 1 таблетке) соответственно 0,5 мг и 2,0 мг мелоксикама, а также вспомогательные вещества: лактозу моногидрат, кроскармеллозу натрия, стеарат кальция, желатин, аэросил, пищевую добавку «Аромат мясной Тирольский».

3. По внешнему виду препарат представляет собой двояковыпуклые таблетки, круглой формы, с риской по центру, от светло-желтого до желтого цвета, с характерным запахом.

Срок годности препарата Мелоксигард при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства.

Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают Мелоксигард расфасованным по 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной (блистер), которые упаковывают в картонные пачки по 1 блистеру вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, при температуре от 0 °С до 30 °С.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Мелоксигард относится к фармакотерапевтической группе: нестероидные противовоспалительные лекарственные препараты группы оксикамов.

10. Мелоксикам, входящий в состав препарата, обладает выраженным противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием, механизм которого основан на способности ингибировать выработку циклоксигеназы в цикле арахидоновой кислоты, подавляя преимущественно циклоксигеназу-II, под влиянием которой происходит синтез воспалительных простагландинов, вызывающих воспаления, отек и боль.

При пероральном применении лекарственного препарата мелоксикам легко всасывается в кишечнике и достигает максимальной концентрации в плазме крови в течение 7,5 часов, период полувыведения составляет 24 часа. Метаболизируется мелоксикам в печени,

выводится из организма главным образом с желчью (до 75%) в основном в виде метаболита глюкуроновой кислоты.

Мелоксигард по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), в рекомендуемых дозах не обладает эмбриотоксическим, тератогенным и канцерогенным действиями. Можно заменить на ГОСТ 32644-2014 (5 класс опасности, если ЛД₅₀ при пероральном введении превышает 2000 мг/кг; 4 - если от 300 до 2000).

III. Порядок применения

11. Мелоксигард применяют собакам и кошкам в качестве противовоспалительного, жаропонижающего и болеутоляющего средства при воспалительных и болевых синдромах различного происхождения, включая острые и хронические заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, синовиты, вывихи), воспалительные заболевания мягких тканей, а также в послеоперационный период.

12. Противопоказаниями к применению препарата Мелоксигард являются индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата, язва желудка и 12-перстной кишки, выраженная почечная, печеночная и сердечная недостаточность, геморрагический синдром, животные в состоянии дегидратации, гиповолемии и гипотензии, ввиду возможного токсического влияния лекарственного препарата на почки.

13. При работе с препаратом Мелоксигард следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для животных. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Мелоксигард. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Не следует применять Мелоксигард беременным и лактирующим самкам, щенкам и котятм моложе 6-недельного возраста.

15. Мелоксигард применяют животным индивидуально, перорально, 1 раз в сутки, во время кормления.

Собаки			Кошки
Дозировка препарата	Мелоксигард 0,5 мг	Мелоксигард 2,0 мг	Мелоксигард 0,5 мг
1 -й день лечения	2 таблетки на каждые 5 кг массы тела животного	2 таблетки на каждые 20 кг массы тела животного	1 таблетка на каждые 5 кг массы тела животного
	0,2 мг мелоксикама/1 кг массы тела животного		
2-й и последующие дни лечения	1 таблетка на каждые 5 кг массы тела животного	1 таблетка на каждые 20 кг массы тела животного	0,1 мг мелоксикама /1 кг массы тела животного
	0,1 мг мелоксикама/1 кг массы тела животного		

Продолжительность лечения определяется конкретным диагнозом и интенсивностью проявления клинических симптомов. В острых случаях лечение препаратом Мелоксигард продолжается в течение 5-7 дней. При хроническом течении заболевания у собак возможно применение препарата в течение 28 дней под контролем ветеринарного врача.

У кошек продолжительность терапии препаратом Мелоксигард не должна превышать 4 дней подряд.

16. При применении препарата Мелоксигард, как и при применении других нестероидных противовоспалительных препаратов, в редких случаях в первые дни лечения животного возможны потеря аппетита, рвота, диарея. Указанные симптомы, как правило, исчезают после отмены препарата. При индивидуальной повышенной чувствительности животного к компонентам препарата и проявлении аллергических реакций применение препарата прекращают и животному назначают антигистаминные и симптоматические препараты.

17. Симптомы передозировки при применении препарата у животного могут проявляться рвотой, диареей, анорексией, угнетенным состоянием, желудочно-кишечным кровотечением. Специфические антитоксические препараты отсутствуют, животному назначают симптоматические препараты и поддерживающую терапию.

18. Не следует одновременно применять Мелоксигард с другими нестероидными противовоспалительными препаратами, глюкокортикостероидами, диуретиками, антикоагулянтами, аминогликозидными антибиотиками и другими лекарственными препаратами, для которых характерна высокая степень связывания с сывороточными белками, из-за вероятности взаимного усиления нефротоксического действия, а также ранее, чем через 24 часа после окончания применения предыдущего нестероидного противовоспалительного препарата.

19. Особенности действия лекарственного препарата при первом его применении или отмене не выявлено.

20. В случае пропуска очередной дозы применение препарата Мелоксигард следует возобновить в предусмотренных дозах и схеме применения. Не следует вводить двойную дозу для компенсации пропущенной.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения

АО «Научно-производственная фирма
«Экопром»; Московская обл.,
г. Люберцы, р.п. Томилино,
ул. Гаршина, д. 11/23.

Наименование и адрес организации,
уполномоченной владельцем
регистрационного удостоверения
лекарственного препарата на принятие
претензий от потребителя

АО «Научно-производственная фирма
«Экопром»; Московская обл.,
г. Люберцы, р.п. Томилино,
ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263.

Генеральный директор

АО «Научно-производственная фирма «Экопром»



В.В. Тарабрин